

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

HAUTE GARDE HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX TEL 92.41 42

ABONNEMENT ANNUEL 85 F

Régisseur de recettes de la D.D.A

C.C.P. Montpellier 5238-57

2 DECEMBRE 1982

N° 20 bis

ÉDITION SPÉCIALE - DÉPARTEMENT DU GARD

PUCERONS ET JAUNISSE NANISANTE

Certaines espèces de Pucerons, souvent présentes sur repousses de céréales ou semis précoces, sont responsables de la transmission d'un virus provoquant une grave maladie des céréales : la JAUNISSE NANISANTE DE L'ORGE (J.N.O.)

Cette maladie qui peut entraîner une baisse de rendement très importante est inoculée dès l'automne.

La seule façon d'éviter son installation consiste à détruire les pucerons vecteurs ; en sachant que plus le temps est doux, plus il y a risque d'activité de ces insectes.

La présence de pucerons vecteurs de la J.N.O. est décelée sur de nombreuses parcelles d'orges du Gard (sur quelques parcelles de blé également). Actuellement, l'importance des populations est extrêmement variable. Dans certaines situations, les pucerons sont présents depuis le stade 1 - 2 feuilles : Petite Camargue, Région d'Alès, Uzège.

Il convient donc d'être extrêmement vigilant et ce d'autant plus que le J.N.O. s'est déjà manifestée l'an dernier dans le département du Gard :

Pour cela :

- OBSERVER les céréales (orge en priorité) pour déceler les pucerons.

L'observation est facilitée l'après midi par temps doux et calme.

Attention, un nombre de pucerons très faible (1 pour 3 - 4 plants de céréales) est suffisant pour transmettre la maladie.

- Une semaine après, VERIFIER si les pucerons sont toujours présents.

- Dans ce cas TRAITER avec l'un des produits suivants :

Bromophos	:	NEXION EC 40	1	litre/hectare
	:	SOVI - NEXION 25 EM	1,5	l/ha
	:	RHODIANEX	1,5	l/ha
Cypermethrine	:	CYMBUSH	0,2	l/ha
	:	KAFIL - SUPER	0,2	l/ha
Deltamethrine	:	DECIS	0,3	l/ha
Fenvalerate	:	SUMICIDINE	0,3	l/ha

Tirage du 2 décembre 1982 - 500 exemplaires

Bulletin Technique des Avertissements Agricoles - Montpellier

Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles - Place Chaptal MONTPELLIER - Le Directeur M. FREYDIER

Reg. d'inscription P P 531 A.D

7409